



Alvogen

Lotus  
美時化學製藥股份有限公司

# 產品手冊



 **立足台灣，放眼國際**

# CONTENT

公司簡介 AUBOT US  3

市場觸角 MARKET DISTRIBUTION  5

產品介紹 PRODUCT  8

女性保健產品 8

---

中樞神經用藥 11

---

心血管及新陳代謝用藥 16

---

疼痛管理用藥 21

---

骨質疏鬆用藥 25

---

癌症用藥 28

---

其他用藥 35

---

營養保健 40

---

AUBOT US

## 認識我們

創立於 1966 年的美時化學製藥是領先的學名藥製藥公司，總部設於台灣，著重於為全球市場開發與製造高價值的學名藥。美時的發展重點在於透過公司內部資源對焦及優異的製造能力，滿足全球迅速成長且未竟的抗癌市場醫療需求，以期讓患者、員工與股東皆受益。

美時在台灣的證券櫃檯買賣中心 (TPEX) 掛牌上市，股票代碼為 1795.TWO。



“美時矢志成為研發與製造口服  
抗癌藥品的領導製藥公司”

— 羅伯·魏斯曼 (Robert Wessman), 美時化學製藥董事長

## 美時化學製藥與 艾威群集團

2014 年，私人的全球製藥公司艾威群集團 (Alvogen) 成為美時化學製藥的最大股東，並以艾威群集團全球策略為出發點著手重組其產品組合與組織。美時擁有台灣與韓國二個直營市場、三處製造據點與兩個研發中心，並擁有超過 70 項研發案 (pipeline)，特別著重於開發口服抗癌藥物。

做為艾威群的一份子，美時善用艾威群的商業通路優勢找尋 B2B 合作夥伴，並分享艾威群直營市場的商業支援與研發合作關係，有益於美時熟悉全球市場複雜的法規環境。此相輔相成的關係提供了美時全球的觸角，有效極大化研發效益與智慧財產權價值，增進企業價值。

美時優秀的領導團隊與其在全球成功的商業成就，輔以與艾威群的協同關係，創造了一流製藥公司必備強而有力的產品組合與研發中產品線。

## MARKET DISTRIBUTION

### 市場觸角

美時善用艾威群廣闊的商業合作觸角提升研發案的價值。除了在美時設有商業據點的區域直接銷售與行銷產品外，公司亦透過艾威群旗下 30 多個市場足跡以及艾威群遍布全球的 B2B 網絡進入其他市場或促使一流製藥公司與美時結盟。

這些市場觸角讓美時具備了可在全球各個市場中配銷產品而不致承受太大商業風險的能力。

	亞太	美國	西歐	中東歐	中東與北非	拉丁美洲
美時直營市場	<input type="radio"/>					
艾威群全球觸角	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		
B2B	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

### 美時的數據資料



3

間製造工廠



70+

項研發中藥物  
(Pipeline)



300+  
個銷售產品



1000+


位員工分布於多個部門，  
並有大約 300 位銷售與行銷人員

## 營運足跡

2017 年，艾威群集團在全球各市場合併營收達逾 10 億美元。

公司預估 2018 年所有區域市場都將成長，並期望能在全球實現超過 12 億美元的營收。以美時而言，透過直接進入以及與艾威群策略合作進入的市場，美時藥品可觸及多達 35 個國家，包括台灣、韓國以及艾威群的重要市場，包含美國、俄羅斯、羅馬尼亞、匈牙利與波蘭等。

艾威群依市場分類的全球營收



\* 在亞太地區，美時貢獻了絕大多數的營收

### 獨特利基的商業架構：

- 擁有諸多成功經驗的經營團隊
- 全面進入美國醫院與開架銷售的學名藥通路
- 超過 400 位專業人員，縝密涵蓋整個中東歐市場，廣泛觸及醫師、藥局與病患的業務團隊
- 美時在台灣與韓國市場有完整布局，有 300 多位專業人員組成業務行銷團隊，且透過艾威群的其他亞洲子公司將產品銷往其他 12 個亞洲國家



08

# 女性保健產品

Woman Healthcare

---

保諾 Apano

喜婦寧錠 Cimidona

愛己 Gveza 3 mg/0.03 mg

愛薇 Gveza 3 mg/0.02 mg



● "美時" 保諾錠 200 毫克

管制用藥


**Apano Tablets 200 mg "L.o."**

**主成分** Mifepristone 200 mg

**適應症** 懷孕前期 (小於七週) 子宮內孕之人工流產。

**用法用量** 口服使用 3 顆，兩天後 (48hr) 服用 Cytotec 2-3 錠，留院觀察 3 小時。

- 產品特色**
- 提供了婦女們安全且非侵入性的方式來進行人工流產
  - 國際級品質唯一安全有效的人工流產藥物
  - 早期懷孕中止之選擇



10s/box

50s/box

● 喜婦寧錠

處方用藥

指示用藥

保健食品


**Cimidona Tablets**

**主成分** Cimicifuga Racemosa, Black Cohosh (Ze450) 6.5 mg

**適應症** 適用於更年期的常見病症 (熱潮紅、出汗、睡眠障礙、焦躁以及憂鬱)。

**用法用量** 一天服用一顆，並配水吞服，不可咬碎或咀嚼。

- 產品特色**
- 唯一非荷爾蒙選擇
  - 天然萃取自北美黑升麻
  - 瑞士進口



30s/box

**愛己膜衣錠 3 毫克 /0.03 毫克**

處方  
用藥

指示  
用藥

保健  
食品


**Gveza 3 mg/0.03 mg Film-coated Tablets**

**主成分** Ethinyl Estradiol 0.03 mg, Drospirenone 3 mg

**適應症** 口服避孕藥。

**用法用量** 每日一錠，連續 21 天。

- 產品特色**
- 歐洲原裝進口
  - 加拿大 BE 試驗
  - 製造於 Chemo，荷爾蒙製劑的權威廠



21s/box

**愛薇膜衣錠 3 毫克 /0.02 毫克**

處方  
用藥

指示  
用藥

保健  
食品


**Gveza 3 mg/0.02 mg Film-coated Tablets**

**主成分** Ethinyl Estradiol 0.02 mg, Drospirenone 3 mg

- 適應症**
1. 避孕。
  2. 治療有避孕需求且選擇使用口服避孕藥的婦女之中度痤瘡。

**用法用量** 每日一錠。

- 產品特色**
- 超低劑量雌激素
  - 無停藥期，方便不漏吃
  - 雙效合一



28s/box

# 11

## 中樞神經用藥

CNS

---

諾康停 Comtan

解佳益 Desud plus

美舒鬱 Mesyrel

巴可癒 Parkryl

始立 Stalevo

妥品美 Topinmate

優活 UFree ER

威智錠 Witgen

## 諾康停膜衣錠 200 毫克

處方  
用藥指示  
用藥保健  
食品

### Comtan Film-Coated Tablet 200 mg


**主成分** Entacapone 200 mg  
**適應症** 併用 Levodopa/Benserazide 或者 Levodopa/Carbidopa 兩類藥品治療帕金森氏症病人。

**用法用量** 本藥須由醫師處方使用。

1. Entacapone 僅能與 Levodopa/Benserazide 或 Levodopa/Carbidopa 併用。上述 Levodopa 配方之處方資料亦適用於與 Entacapone 合併使用時。
2. Comtan 每錠 200 mg 配合每次 Levodopa/Dopa decarboxylase 抑制劑之劑量，每日最高之推薦劑量為：每次 200 mg，一天 10 次，亦即一天總計量為 entacapone 2000 mg。

**產品特色**

- ↑ “on” time，↓ “off” time 和 ↓ LD 劑量
- 改善動作及日常生活功能



## 解佳益 8/2 毫克舌下錠

處方  
用藥指示  
用藥保健  
食品

### Desud plus Sublingual Tablets


**主成分** Buprenorphine Hydrochloride 8 mg, Naloxone HCl Dihydrate 0.5 mg

**適應症** 適用於鴉片類成癮的治療。

**用法用量** 初期投予 2-4 mg，未出現戒斷症狀則可給予 8-16 mg/day。藥錠置於舌下，未溶解前盡量不要吞口水。

**產品特色**

- 藥物可攜回家，患者無須每日到院服藥，有效提高患者生活品質
- 臨床成效好，維持醫院替代治療留置率
- 特殊複方劑型，有效加強病患抗拒毒品信心



7s\*4/box

## 美舒鬱錠 25/50/150 毫克

處方  
用藥指示  
用藥保健  
食品

### Mesryrel Tablet 25/50/150 mg

**主成分** Trazodone Hydrochloride 25/50/150 mg


**適應症** 治療各種型態之抑鬱症。

**用法用量**

1. 起始劑量為每天 150 mg 分次服用，然後每 3-4 天按 50 mg/day 的量增加，直到獲得適當的效應。
2. 嚴重憂鬱症：每天最高劑量為 600 mg 分次投與。

**產品特色**


- 抗膽鹼作用少
- 無藥物濫用問題
- 提高患者睡眠品質



25mg

500s/bot

AC43431100



50mg

500s/bot ( AC33664100 )

10s\*50/box ( AC336641G0 )



150mg

100s/bot

AC40198100

## 巴可癒錠

處方  
用藥指示  
用藥保健  
食品

### Parkryl Tablets


**主成分** Deprenyl L- HCl (=Selegiline HCl) 5 mg

**適應症** 巴金森病症之輔助治療劑。

**用法用量** 每日二次，餐後服用。

**產品特色**

- 單獨使用在早期的巴森氏症可以改善運動方面的症，延緩使用左旋多巴的時間
- 使用在晚期的巴森氏症時，併用左旋多巴可以低左旋多巴的劑，延長左旋多巴的作用時間，減少藥效不足的時間



100s/bot

AC36215100

**始立 膜衣錠 100/25/200 毫克**

處方  
用藥

指示  
用藥

保健  
食品


**Stalevo Film-Coated Tablet 100/25/200 mg**

**主成分** Levodopa 100 mg , Carbidopa 25 mg , Entacapone 200 mg

**適應症** 表現藥效終期運動功能波動現象，以左多巴 / 多巴  
脫羧基酶抑制劑無法達到穩定治療效果之巴金森氏症病人。

**用法用量** 本藥須由醫師處方使用。理想的每日劑量需透過  
小心標定每位病人的 Levodopa 來決定。使用前請  
詳見仿單。

- 產品特色**
- Reduce pill burden 三合一，減少服藥顆粒數，患者易吞服
  - Cost-effectiveness 成本效益，減少 12%，提供較好生活品質



30s/bot

BC24171100

**妥品美錠 25/100 毫克**

處方  
用藥

指示  
用藥

保健  
食品


**Topinmate Tablets 25/100 mg**

**主成分** Topiramate 25 /100 mg

**適應症** 廣泛癲癇適應症用藥、預防偏頭痛。

**用法用量** 起始劑量 25-50 mg/day，每週增加 25-50 mg/  
day，維持劑量 200 mg bid。

- 產品特色**
- 副作用會造成病患體重減輕，病患因體重得到控制而增加服藥順從性，進而有效改善疾患




25mg

500s/bot

10s\*10/box

AC48099100



100mg

10s\*10/box

AC48055100

**優活持續釋放膜衣錠 500 毫克**

處方用藥

指示用藥

保健食品


**UFree ER Tablets 500 mg**

**主成分** Levetiracetam 500 mg

**適應症** 治療十二歲以上病患之局部癲癇發作之輔助治療。

**用法用量** 一開始治療的劑量應為每日一次 1000 毫克。每兩週可將每日劑量調整增加 1000 毫克，建議的每日最大劑量為 3000 毫克。

- 產品特色**
- 緩釋劑型維持血中濃度穩定，在神經、精神、及營養代謝系統副作用較低
  - 一天服用一次方便性佳，可提高服藥順從性
  - 具生物相等性，可與 IR 劑量直接轉換



7s\*4/box  
AC56702100

**威智錠 10 毫克 / 威智滴劑**

處方用藥

指示用藥

保健食品

**Witgen Tablets 10 mg/Witgen Oral Drop**

**主成分** Memantine Hydrochloride 10 mg, 滴劑 10mg/ml


**適應症** 治療中重度及重度阿滋海默症。

**用法用量** 第一週為一天一次 5 mg，滴劑 0.5 毫升，之後依醫師處方調整劑量。最大劑量每日 20 mg，滴劑 2 毫升。

- 產品特色**
- 減緩疾病的發展，有效改善認知功能
  - 適用於吞嚥困難病患



30 ml/bot  
AC52438143



7s\*4/box  
AC46612100

# 16

## 心血管及新陳代謝用藥

CVM

---

艾歐復隆 Alvolon

艾妥搏穩 Alvoprel

艾疏脂 Alvostat

可諾通 Clopidogrel

鈣臨 Caphos

抵克醣 Deglu

美胰 Mezide

脈利錠 Milix / 因達脈 Milix Sr

艾歐復隆膜衣錠 500 毫克

處方  
用藥

指示  
用藥

保健  
食品

Alvolon 500 mg Film-coated Tablets

**主成分** Diosmin 500 mg

**適應症** 協助改善慢性靜脈功能不全引起之局部腫脹或疼痛、痔瘡症狀之緩解。

**用法用量** 建議隨餐口服，建議劑量為 1 錠 BID。  
急性痔瘡發作：建議劑量為前 4 日 1 錠 TID，接下來 3 日 1 錠 BID。

**產品特色**

- 屬於天然的類黃酮苷，歐洲上市 30 年
- 效果明顯，副作用少，安全性高
- A 級臨床證據的口服靜脈活化劑



20s/box

艾妥搏穩膜衣錠 300 毫克

處方  
用藥

指示  
用藥

保健  
食品

Alvoprel Film Coated Tablet 300 mg


**主成分** Irbesartan 300 mg

**適應症** 本態性高血壓。治療併有高血壓及第二型糖尿病患者的  
高血壓及糖尿病性腎病變。

**用法用量** 起始劑量及維持劑量為每日一次，每次 150 mg，隨  
餐或空腹服用。

**產品特色**

- 各醫院藥局通路販售廣



28s/box

BB26409100

## 艾疏脂膜衣錠 10 毫克


處方  
用藥

指示  
用藥

保健  
食品

### Alvostat Film Coated Tablets 10 mg

- 主成分** Rosuvastatin Calcium 10 mg  
**適應症** 高膽固醇血症，高三酸甘油酯血症。  
**用法用量** 起始劑量是 10 mg 每天一次。  
**產品特色** ● 各醫院藥局通路販售廣



28s/box

BC26543100

## 可諾通 "艾威群" 膜衣錠 75 毫克


處方  
用藥

指示  
用藥

保健  
食品

### Clopidogrel "Alvogen" F.C. Tablets 75 mg

- 主成分** Clopidogrel 75 mg  
**適應症** 降低近期發生中風、心肌梗塞或周邊動脈血管疾病的粥狀動脈硬化病人之粥狀動脈栓塞事件的發生。與 ASPIRIN 併用降低非 ST 段上升之急性冠心症病人之粥狀動脈栓塞事件。與 ASPIRIN 併用可用於以內科治療的 ST 段上升之急性心肌梗塞病人。  
**用法用量** 75 mg, QD。  
**產品特色** ● 各醫院藥局通路販售廣



14\*10/box

AB57819100

**鈣鹽錠 667 毫克**

處方  
用藥

指示  
用藥

保健  
食品

**Caphos Tablets 667 mg**


**主成分** Calcium Acetate 667 mg

**適應症** 腎衰竭末期之高磷酸鹽血症。

**用法用量** 每日三次，每次 2-4 顆，依血磷值調整直到病人血中磷酸鹽值低於 6 mg/dl 為止。

**產品特色**

- 咬碎後和米飯或食物一起吃下肚，有效達到降磷的效果



500s/bot ( AC37520100 )

10s\*100/box ( AC375201G0 )

**抵克醣錠 50 毫克**

處方  
用藥

指示  
用藥

保健  
食品

**Deglu Tablets 50 mg**


**主成分** Acarbose 50 mg

**適應症** 非胰島素依賴型糖尿病之治療。

**用法用量** 初期：一天三次，每次一錠，隨餐服用。  
後繼：一天三次，每次二錠，隨餐服用。

**產品特色**

- 抑制碳水化合物在腸道之分解和吸收，當患者之飲食以碳水化合物為主時，Acarbose 有較佳的降血糖及瘦身的效果
- 降低飯後血糖值，其單獨使用並不會造成低血糖的現象，因此相當安全



10s\*50/box

500s/bot

AC45646100

**美胰錠 80 毫克**

處方  
用藥

指示  
用藥

保健  
食品


**Mezide Tablets 80 mg**

主成分 Gliclazide 80 mg

適應症 成人型糖尿病。

用法用量 劑量按照糖尿病的嚴重程度由醫師決定之 BID 或 TID。

- 產品特色
- 第一個有代謝與血管作用的口服抗糖尿病劑
  - 24 小時恢復血糖的穩定性。
  - 藉干預 3 個因素而對抗微血栓形成：減少血小板的粘着和聚集、避免纖維蛋白在微血管壁不正常的沉積、對抗 Adrenaline 血管收縮



10s\*50/box

AC309701G0

**"美時" 脈利錠 1.25 毫克 / 因達脈持續性藥效錠 1.5 毫克**

**Milix Tablets 1.25 mg "M.S."/Milix Sr Tablets 1.5 mg "Lotus"**

處方  
用藥

指示  
用藥


保健  
食品

主成分 Indapamide (Hemihydrate) 1.25/1.5 mg

適應症 高血壓

用法用量 每日口服一錠。


- 產品特色
- 各醫院藥局通路販售廣



脈利錠

500s/bot

AC42380100



因達脈

500s/bot

AC46538100

# 21

## 疼痛管理用藥

Pain/AIR

---

雅努麻 Arheuma

倍鬆 Befon

全妥 噴鼻液 Butaro Nasal Spray

妙而通 Muaction

瑪舒可 Musgud

頓痛特 Tramtor

## “美時” 雅努麻錠 10/20 毫克

處方  
用藥指示  
用藥保健  
食品

### Arheuma 10/20 mg


**主成分** Leflunomide 10/20 mg

**適應症** 治療成人類風濕性關節炎，治療具活動性的成人乾癱性關節炎。

**用法用量** 10 mg-20 mg，一天一次。

**產品特色**


- 根據 EULAR 建議，Arheuma 應視為一線治療的一部份
- 效果和 MTX 相當，可取代 MTX 或是合併使用
- 可單獨或合併生物製劑



10mg

10s\*10

AC48558100



20mg

10s\*10

AC45971100

## “美時” 倍鬆錠 5/10 毫克（貝可芬）

處方  
用藥指示  
用藥保健  
食品

### Befon 5/10 mg


**主成分** Baclofen 5/10 mg

**適應症** 限於脊髓和大腦疾病或損傷引起的肌肉痙攣。

**用法用量** 成人初劑量 1 日 5-15 mg，1-3 次飯後分次服用，達標準用量 1 日 30 mg 2-3 日。小兒初劑量 1 日 5 mg，1-3 次飯後分次服用，達標準用量 (15-12 歲 5-25 mg，7-11 歲 5-20 mg，6-4 歲 5-15 mg) 2-3 日。

**產品特色**


- 作用於中樞的肌肉鬆弛劑



5mg

500s/bot

AC37141100



10mg

500s/bot

AC37140100

## ● "美時" 全妥 噴鼻液 10 毫克 / 毫升

處方  
用藥指示  
用藥保健  
食品

### Butaro Nasal Spray 10 mg/ml

**主成分** Butorphanol Tartrate 10 mg

**適應症** 使用鴉片類止痛劑治療的疼痛。

**用法用量** 一般建議初始劑量 1 mg (單側鼻腔，一次)。若 60-90 分鐘內沒有充分得到疼痛紓解可以追加 1 mg。對於重度疼痛的處理，初始劑量 2 mg (單側鼻腔，一次)。

**產品特色**

- 鼻噴劑型，病患自控式積極疼痛治療
- 15 分鐘產生疼痛緩解，一小時內達最大作用
- 鼻黏膜吸收效果好，1 mg butorphanol 可產生 5-8 mg morphine 之止痛效果



2.5 ml/bot

## ● "美時" 妙而通持續釋放錠 100 毫克

處方  
用藥指示  
用藥保健  
食品

### Muaction SR Tablets 100 mg


**主成分** Tramadol HCl 100 mg

**適應症** 中度至嚴重性的急慢性疼痛。

**用法用量** 成人及 14 歲以上的青少年使用本藥的一般劑量為：每次配合開水服用 1-2 粒，最好早晚各服用一次。

**產品特色**

- 有鴉片類藥物效果但成癮性和副作用較低的強效止痛藥
- 長效劑型，提供和 IR 一樣止痛效果，副作用較少
- BID 使用，患者遵囑高



100s/bot

10s\*10

AC42770100

## 美時 " 瑪舒可錠 5/10 毫克

處方  
用藥指示  
用藥保健  
食品

### Musgud 5/10 mg


**主成分** Cyclobenzaprine HCl 5/10 mg

**適應症** 緩解急性骨骼肌肌肉之痙攣。

**用法用量** 每次服用 5-10 mg；一天三次。

**產品特色**


- 改善肌疼痛痙攣及睡眠品質
- 最有實證的骨骼肌肉鬆弛劑
- 國內臨床及第一家上市



5mg

10s\*50

AC48363100



10mg

10s\*50

AC45020100

## 頓痛特注射液 / 膠囊 50 毫克 ( 鹽酸妥美度 )

### Tramtor Inj. 50ml/Tramtor 50 mg

處方  
用藥指示  
用藥保健  
食品

**主成分** Tramadol HCl 50 mg/ml

**適應症** 中度至嚴重性的急慢性疼痛。

**用法用量** 靜脈注射、肌肉注射、皮下注射：1-2 毫升。

單劑量：成人及 14 歲以上青年男女：一次一膠囊。

一天之劑量：不超過 400 mg。


**產品特色**

- 有鴉片類藥物效果但成癮性和副作用較低的強效止痛藥



2 ml/vial\*50/box

AC38145212



100s/bot

10s\*50/box

AC41557100

# 25


## 骨質疏鬆用藥

Osteoporosis

---

骨力強 Aclasta

美善 Martril



**骨力強注射液 5 毫克 / 100 毫升**

限醫師使用

**Aclasta 5 mg/100 ml Solution for infusion****主 成 分** Zoledronic acid 5 mg/100 ml**適 應 症** 治療骨佩吉特氏病。治療停經後婦女的骨質疏鬆症。男性骨質疏鬆症之治療，以增加骨密度。治療及預防男性與女性因類固醇引起之骨質疏鬆症。預防停經後婦女的骨質疏鬆症。**用法用量** 一年施打一次，每次施打至少 30 分鐘靜脈輸注。**產品特色**

- 一年只須施打一次，一年遵醫囑性 100%
- 連續施打 3 年，降低 77% 骨質疏鬆導致的脊椎骨折、41% 髖部骨折及 25% 其他部位骨折發生率

5 mg/100 ml  
BC24692255

“美時”美善膠囊 250 毫克

處方  
用藥

指示  
用藥

保健  
食品

**Martril Capsules 250 mg**

**主成分** Glucosamine Sulfate Crystalline 250 mg

**適應症** 緩解退化性關節炎之疼痛。

**用法用量** 輕微度或中等程度之關節症狀：每天兩次，每次 2 粒。  
嚴重症狀之關節炎：每天三次，每次 2 粒。

- 產品特色**
- 臨床文獻證實藥品級可有效緩解症狀及延緩疾病
  - 為輕度退化性關節炎之首選用藥



100s/box

500s/box

# 28

## 癌症用藥

Oncology

---

艾亭寧 Alvoteinib

艾舒尼 Alsuni

艾納脈 Anamide

艾卡培 Capecitabine

康斯吐 Grantron

易莎平 Ixempra

嵐霓 Lenli

美佳特 Megatus

特莫斯 Tamos

費艾舒 Veiasu

艾亭寧膜衣錠 100/400 毫克

處方用藥

指示用藥

保健食品

Alvotinib 100/400mg Film-Coated Tablets


**主成分** Imatinib Mesylate 100/400 mg

**適應症** 治療慢性骨髓性白血病 (CML)、成年人無法手術切除或轉移的惡性胃腸道基質瘤、成人 KIT(CD 117) 陽性胃腸道基質瘤完全切除後之術後輔助治療、費城染色體陽性急性淋巴性白血病 (Ph+ ALL)、與血小板衍生生長因子受體 (PDGER) 基因重組相關之骨髓發育不全症候群 (MDS)/ 骨髓增生性疾病 (MPD)、系統性肥大細胞增生症 (SM)、有 PDGFR 基因重組的嗜伊紅性白血球增加症候群 (HES) 或慢性嗜伊紅性白血病 (CEL)、手術無法切除、復發性或轉移性且有 PDGER 基因重組之隆突性皮膚纖維肉瘤 (DFSP)。


**用法用量** 400-800 mg，QD。

**產品特色**

- 兩種劑量 方便臨床劑量調配
- 副作用小 耐受性佳
- 口服劑型 可剝半 使用便利
- 歐盟核准



100mg  
120s/box  
BB26613100



400mg  
30s/box  
BB26614100

## 艾舒尼膠囊 12.5/25/37.5/50 毫克

處方  
用藥指示  
用藥保健  
食品

### Alsuni Capsules 12.5/25/37.5/50 mg

**主 成 分** Sunitinib 12.5/25/37.5/50 mg

**適 應 症**

1. 適用於 imatinib mesylate 治療期間出現疾病惡化或對該藥出現不能忍受之腸胃道間質腫瘤 (GIST)。
2. 適用於治療晚期或轉移性腎細胞癌 (RCC)，病理上為亮細胞癌。
3. 適用於進展性，無法切除或轉移性分化良好之胰臟神經內分泌腫瘤 (pNET)。

**用法用量**

1. 用於 GIST 及 RCC：50 mg 一天一次，治療四周後，停藥 2 周後繼續服用。
2. 用於 pNET：37.5 mg 一天一次，無停藥期。

## 艾納脈軟膠囊 40 毫克

處方  
用藥指示  
用藥保健  
食品

### Anamide Soft Capsule 40 mg

**主 成 分** Enzalutamide 40 mg

**適 應 症**

1. 藥物或手術去勢抗性的轉移性前列腺癌，且在雄性素去除療法失敗後屬無症狀或輕度症狀而不須使用化學治療者。
2. 藥物或手術去勢抗性的轉移性前列腺癌且已接受過 docetaxel 治療者。

**用法用量** 160 mg ( 4 顆 40 mg 膠囊 )，一天一次。

艾卡培 "艾威群" 膜衣錠 500 毫克

處方  
用藥

指示  
用藥

保健  
食品


Capecitabine Alvogen 500 mg Film-Coated Tablets

**主成分** Capecitabine 500 mg

**適應症** 可治療轉移性大腸（結腸直腸）癌病患。可作為第三期結腸癌患者手術後的輔助性療法。可單獨或並用於局部晚期或轉移性乳癌病患及晚期胃癌之第一線治療。

**產品特色**

- 適應症廣，可適用在乳癌 / 胃癌 / 大腸直腸癌患者
- 口服劑型方便使用



120s/box  
BC26914100

康斯吐靜脈注射液 1 毫克 / 毫升

處方  
用藥

指示  
用藥

保健  
食品

Grantron I.V. Injection 1 mg/ml

**主成分** Granisetron 1 mg/ml

**適應症** 預防及治療抗腫瘤化學療法、放射線療法、手術後引起的噁心、嘔吐。

**產品特色**

- 預防及治療化 / 放療的噁心及嘔吐



1 mg / ml 安瓿  
AC49177216

## 易莎平注射劑

處方  
用藥

指示  
用藥

保健  
食品

### Ixempra for Injection

**主成分** Ixabepilone 15 mg

**適應症** 合併 capecitabine 用於治療對 Anthracycline 和 Taxane 治療有抗藥性，或對 Taxane 有抗藥性又不能接受進一步 Anthracycline 治療的轉移性或局部晚期乳癌患者。

**用法用量** 一般建議劑量是 40 靜脈輸注 3 小時，每 3 周一次。

**產品特色**

- 健保給付於併用 Capecitabine 轉移性或局部晚期乳癌患者
- 2020 NCCN guideline
- 美國 FDA 核可



1s/box

BC25053235

## 嵐霓膠囊 5/10/15/25 毫克

處方  
用藥

指示  
用藥

保健  
食品

### Lenli Capsules 5/10/15/25 mg


**主成分** Lenalidomide 5/10/15/25 mg

**適應症** 與 dexamethasone 合併使用可治療先前已接受至少一種治療失敗之多發性骨髓瘤患者。

**用法用量** 起始劑量為每日 25 mg，在 28 天用藥週期的第 1 至 21 天，每日服用 1 顆 25 mg 膠囊。患者不應打破、嚼碎或打開膠囊。

**產品特色**


- 耐受性佳，口服使用便利



5mg

21s/box


AC59896100



10mg

21s/box


AC59897100



15mg

21s/box

AC59898100



25mg

21s/box

AC59808100

**美佳特口服懸液劑 40 毫克 / 毫升**

處方用藥

指示用藥

保健食品

**Megatus Oral Suspension 40 mg/ ml**

**主成分** Megestrol 40 mg/ml

**適應症** 後天免疫缺乏症候群患者的厭食症，及後天免疫缺乏症候群患者及癌症患者之惡病體質引起的體重明顯減輕。

**用法用量** 最初劑量由 160 mg 開始，最高可增加到 400 mg。

**產品特色** ● 耐受性佳，使用經驗廣泛



1s/box  
AC55267157

**特莫斯膠囊 20/100 毫克**

處方用藥

指示用藥

保健食品

**Tamos Capsules 20/100 mg**

**主成分** Temozolomide 20/100 mg

**適應症**

1. 新診斷的多形神經膠母細胞瘤，與放射治療同步進行，然後作為輔助性治療。
2. 給予標準治療後復發性或惡化之惡性神經膠質瘤，例如多形神經膠母細胞瘤或退行性星狀細胞瘤。

**用法用量** CCRT : 75 g/m<sup>2</sup> 每天一次連續使用 42 天，Adjuvant therapy : 150-200 mg/m<sup>2</sup> 每天一次，連續五天後休息 23 天為 1 Cycle。

**產品特色**

- 口服烷基化藥物
- 成人、小孩都可使用



20mg  
5s/box  
AC58025100



100mg  
5s/box  
AC56316100

● 費艾舒膜衣錠 250 毫克

處方  
用藥

指示  
用藥

保健  
食品

**Veiasu Film-Coated Tablets 250 mg**

**主 成 分** Gefitinib 250 mg

**適 應 症** 適用於具有 EGFR-TK 突變之局部侵犯性或轉移性之非小細胞肺癌 (NSCLC) 病患之第一線治療。適用於先前已接受過化學治療後，但仍局部惡化或轉移之肺腺癌病患之第二線用藥。

**用法用量** 250 mg，QD。

**產品特色** ● 耐受性佳，口服使用便利



# 35

## 其他用藥

Other

---

剎咳得 Bensau

皮質醇軟膏 Cort. S. Ointment

停敏 Denosin

抵克特喜 Detosiv

福流 Forflow

普膚乳膏 Ichderm Cream

歐絲麗 Orlistat

咳治得 Zcough



## "美時" 剎咳得軟膠囊 100/200 毫克

200mg  
處方用藥100mg  
指示用藥保健  
食品

### Bensau Soft Capsules 100/200 mg "Lotus"


**主成分** Benzonatate 100/200 mg

**適應症** 解除咳嗽症狀。

**用法用量** 成人每日三次，每次 1-2 膠囊，本品最大劑量為 600 毫克 / 日。

**產品特色**


- 非麻醉、不成癮、迅速有效
- 美國市場使用超過 40 年止咳成份
- 醫學中心使用量最多止咳藥



100mg

500s/bot

A042435100



200mg

500s/bot

AB57991100

## "美時" 皮質醇軟膏 (乙酸皮質醇)

處方  
用藥指示  
用藥保健  
食品

### Cort. S. Ointment 1% "Lotus" (Hydrocortisone Acetate)

**主成分** Hydrocortisone Acetate 10 mg/g

**適應症** 暫時緩解濕疹、尿布疹、蚊蟲咬傷、皮膚搔癢、皮膚炎等皮膚疾患的症狀。

**用法用量** 塗於患部。

**產品特色**

- 無添加防腐劑
- 單一成分減少接觸性過敏的機會
- 低效價類固醇安全性高、刺激少，適合嬰兒及老人



50 g/bot

## "美時" 停敏膜衣錠 5 毫克

處方  
用藥指示  
用藥保健  
食品

### Denosin Film-Coated Tablets 5 mg "Lotus"


**主成分** Desloratadine 5 mg

**適應症** 季節性過敏性鼻炎引起的相關症狀，緩解慢性原發性蕁麻疹相關症狀。

**用法用量** 12 歲以上孩童及成人，每天一次，每次 5 mg。

**產品特色**

- 無鎮靜作用
- 長效，每日服用一錠即可



10s/PTP\*50/box

AC45972100

## "美時" 抵克特喜持續性釋放錠 60 毫克

處方  
用藥指示  
用藥保健  
食品

### Detosiv Sustained Release Tablets 60 mg "Lotus"


**主成分** Dextromethorphan Hydrobromide 60 mg

**適應症** 解除急性、慢性咳嗽症狀。

**用法用量** 每 12 小時服用 1 錠。

**產品特色**

- 長效、持續性釋放
- 錠劑非糖漿



500s/PTP

500s/bot ( AC44781100 )

**"美時" 福流持續釋放錠 400 毫克**


處方  
用藥

指示  
用藥

保健  
食品

**Forflow Sustained Released Tablets 400 mg "M.S."**

- 主成分** Pentoxifylline 400 mg  
**適應症** 末稍血管循環障礙。  
**用法用量** 一天3次，每次100-400 mg。  
**產品特色** ● 各醫院藥局通路販售廣



10s\*50/box  
AC40399100

**普膚乳膏 50 毫克 / 公克 (杜西平)**

處方  
用藥

指示  
用藥

保健  
食品

**Ichderm Cream 50 mg/gm "M.S." (Doxepin)**

- 主成分** Doxepin Hydrochloride 50 mg  
**適應症** 成人濕疹性皮膚炎所致中度搔癢症之短期治療。  
**用法用量** 每日薄層敷塗四次，每次使用至少應間隔3-4小時  
**產品特色** ● 作用快速  
 ● 非類固醇藥物



8 g/box ( AC42214326 )  
8 g\*50/box



15 g/box  
AC42214335

## ● 歐絲麗膠囊 120 毫克

處方  
用藥指示  
用藥保健  
食品

### Orlistat Capsules 120 mg


**主成分** Orlistat 120 mg

**適應症** 配合低卡洛里飲食，適合肥胖病患的治療，包括有與肥胖相關危險因子之病患。

**用法用量** 主餐進行中或最遲進餐後 1 想時內口服一顆，一天三次。

**產品特色**

- 可長期使用有效控制體重並降低心血管危險因子
- 先進歐美規格
- 高純度原料



500s/bot

## ● 咳治得軟膠囊 100 毫克

處方  
用藥指示  
用藥保健  
食品

### Zcough Soft Capsules 100 mg


**主成分** Benzonatate 100 mg

**適應症** 解除咳嗽症狀。

**用法用量** 成人每日三次，每次 1-2 膠囊。

**產品特色**

- 非麻醉、不成癮、迅速有效
- 美國市場使用超過 40 年止咳成份
- 醫學中心使用量最多止咳藥



500s/bot ( AC58202100 )

10s/PTP\*50/box ( AC582021G0 )

# 40

## 營養保健 Healthcare

---

健力鈣 Power Ca

矯捷 UC II Joint

優識 U-Vision

葡萄多酚活力飲品 VITA OPC



## 健力鈣鈣咀嚼錠

處方  
用藥指示  
用藥保健  
食品

### Power Ca Chewable

**主成分** 檸檬酸鈣 800 mg，維生素 D 20 mcg (800 IU)，維生素 C 50 mg

**適應症** 減少骨質流失，增加骨密度。

**用法用量** 每日一錠，餐後搭配開水服用。

- 產品特色**
- 適用於各年齡層
  - 最高單位維生素 D 幫助鈣質吸收
  - 採用市面上高吸收率的檸檬酸鈣



30s/box

90s/box

## 矯捷膠原膠囊

處方  
用藥指示  
用藥保健  
食品

### UC II Joint

**主成分** UC-II<sup>®</sup> 膠原蛋白複合物 40 mg

**適應症** 顯著改善膝蓋伸展能力及緩解不適感。

**用法用量** 每日 1 次，一次 1 粒。

- 產品特色**
- 行動矯捷好活力
  - 臨床效果是葡萄糖胺 + 軟骨素的兩倍以上
  - 含啤酒酵母補充天然維生素 D



30s/box

● 優識金盞花複合液體膠囊

處方  
用藥

指示  
用藥

保健  
食品

**U-Vision Lutein Complex**

**主 成 分** 金盞花抽出物 (5% 玉米黃素) 20 mg, 葉黃素 5 mg, DHA 藻油 125 mg, 紅藻萃取油 (藻紅素 5%) 2 mg

**適 應 症** 視網膜中之葉黃素及玉米黃素可過濾藍光，保護眼睛。

**用法用量** 每日 1-2 次，一次 2 粒。

- 產品特色**
- 游離型葉黃素吸收佳
  - 含專利素食微藻 DHA
  - 護眼配方黃金比例



60s/box

● 葡萄多酚活力飲品

處方  
用藥

指示  
用藥

保健  
食品

**VITA OPC**

**主 成 分** 葡萄籽萃取物，紅葡萄皮萃取物，山桑子萃取物，維生素 C

**適 應 症** 強力抗氧化劑，減少體內自由基。

**用法用量** 每日 1-2 包早晚空腹飲用，每包以 60 c.c. 冷開水沖泡。

- 產品特色**
- 堅持高品質及決無重金屬及農藥污染，亦無添加任何色素及防腐劑
  - 採用來自德國的領導品牌葡萄萃取原料供應商
  - 高科技技術等滲透壓配方快速吸收
  - 內附專用玻璃量杯




30 pack/box (含玻璃量杯)  
60 pack/box (補充包)





 **立足台灣，放眼國際**



#### 營運總部

台北市信義區松仁路 277 號 17 樓  
TEL : +886 2 2700 5908

#### 南投製造及研發中心

南投縣南投市成功一路 30 號  
TEL : +886 49 225 0411

#### 編輯群

美時化學製藥行銷部